

Patientinformation

Diabetesbehandling polikliniska operationer

- Du får äta fram till 8 timmar före operationen
- Du får dricka klara drycker fram till 2 timmar före operationen

1. Kostbehandlad diabetes

- Inga särskilda åtgärder

2. Tabletter

- (t ex Daonil, Mindiab, Glibenklamid, Glimepiride, Repaglinide, Metformin)
- Ta inte diabetestabletterna på morgonen. Vi kontrollerar blodsockervärdet när du kommer till operationsavdelningen.

3. Insulin

- **Basinsulin:** (Humulin NPH, Insulatard, Insuman basal, Lantus eller Levemir)? Ta insulinet som vanligt både på kvällen innan operationen och/eller samma morgon beroende på när du vanligen tar dosen
- **Snabbverkande måltidsinsulin** (Actrapid, Apidra, Humalog, Humulin Regular eller Novorapid) på morgonen? Eftersom du inte äter frukost skall du inte ta något snabbverkande insulin på morgonen
- **Blandinsulin** (Humalog Mix eller Novomix) på morgonen? Ta inte insulinet på morgonen. Vi kontrollerar blodsockret när du kommit till operationsavdelningen och ger därefter vanligen kortverkande insulin

4. Insulinpump

- Behåll insulinpumpen på men ta ingen bolusdos på morgonen. När du kommer till operationsavdelningen mäter vi blodsocker och ger dig ett dropp med sockerlösning.

Om du får insulinkänning skall du givetvis dricka något sött. Ta ingen risk – fastereglerna kommer i andra hand i en sådan situation