

Patientinformation

Diabetesbehandling polikliniska operationer

- Du får äta fram till 8 timmar före operationen
- Du får dricka klara drycker fram till 2 timmar före operationen

1. Kostbehandlad diabetes

- Inga särskilda åtgärder

2. Tabletter och injektioner (ej insulin)

- Ta inte diabetestabletterna eller ge injektionerna på morgonen. Vi kontrollerar blodsockervärdet när du kommer till operationsavdelningen.

Tabletter: Metformin, Glucophage, Glimepirid, Glibenklamid, Mindiab, Novonorm, Repaglinide, Forxiga, Invokana, Jardiance, Steglatro, Januvia, Trajenta, Galvus, Onglyza, Janumet, Komboglyz, Jentaduetto, Xigduo, Synjardy, Segluromet, Qtera, Steglujan, Glyxambi

Injektioner: Byetta, Bydureon, Lyxumia, Trulicity, Victoza, Ozempic

3. Insulin

Basinsulin: (Humulin NPH, Insulatard, Insuman basal, Abasaglar, Toujeo, Lantus, Tresiba, Xultophy, Suliqua eller Levemir)?

- Ta insulinet som vanligt på kvällen innan operationen
- Om du tar insulinet på morgonen tar du endast $\frac{3}{4}$ av dosen.

Snabbverkande måltidsinsulin (Actrapid, Apidra, Fiasp, Lispro, Humalog, Humulin Regular eller Novorapid) på morgonen?

- Eftersom du inte äter frukost skall du inte ta något snabbverkande insulin på morgonen

Blandinsulin (Humalog Mix eller Novomix) på morgonen?

- Ta inte insulinet på morgonen. Kontrollera blodsockret när du kommit till operationsavdelningen och berätta att du inte tagit ditt morgonsinsulin.

4. Insulinpump

- Behåll insulinpumpen på men ta ingen bolusdos på morgonen. När du kommer till operationsavdelningen mäter vi blodsocker och ger dig ett dropp med sockerlösning.

Om du får insulinkänning skall du givetvis dricka något sött. Ta ingen risk – fastereglerna kommer i andra hand i en sådan situation