


SMÄRTKLINIKEN

Läkarmottagning



Smärta

Måste man leva med det?

Det är bara man själv som vet hur ont man har. Smärta syns inte på röntgen eller MR och inte heller vid en undersökning går det se var en människa har ont, hur ont det är eller vilken typ av smärta man känner.

Vid en interventionell utredning av smärta utgår man från patientens berättelse och testar systematiskt del för del i syfte att lokalisera varifrån smärtan kommer.



Kan man på det sättet lokalisera vad det är som gör ont går det ofta att behandla – och även om det inte går att behandla brukar det ofta vara lättare att hantera smärtan när man förstår den bättre!

En vanlig orsak till smärta är facettledsrelaterad smärta. Den ger ofta upphov till överförda smärtor, dvs att smärtan kommer från en del men man upplever det strålar ut i ett ben eller en arm eller upp i huvudet. Denna smärta kan lokaliseras med hjälp av blockader lagda under röntgenkontroll.




Om smärtan kommer från facettlederna är det även behandlingsbart med en s.k. radiovågsbehandling. Man skapar då en tillfällig skada på nerven vilket kan liknas vid en nervblockad som håller i sig i 10-12 månader. Därefter har nerven vuxit ut igen,

men oftast återkommer då inte smärtan. Ifall den återkommer är det möjligt testa igen och vid behov upprepa behandlingen.

Allt sedan 2008 följer vi effekten på hälsorelaterad livskvalitet hos alla patienter. Vi anser att det inte räcker med att bli av med smärtan utan målet är en förbättrad livskvalitet.

Vid uppföljningarna har vi sett en markant förbättring av livskvaliteten hos en övervägande andel av patienterna som utretts och behandlats.



Exempel på tester och behandlingar:

Facettledsblockader

Sakroiliakaledsblockader

Nervrotsblockader

Lumbala sympatikusblockader

Ganglion imparblockader

Ganglion sfenopalatinumblockader

Ganglion stellatumblockader

Ledinjektioner i t.ex:

Höftled

Knäled

Fotled och fotens leder

Axelled och nyckelbenets leder

Armbågsled

Handled och handens leder

Atlantoaxialled

Craniocervicalled

Facettled

Nervblockader

Radiovågsbehandlingar

Facettleder

Sacroiliacaleder

Alla åtgärder sker som en del i en systematisk utredning. De genomförs under röntgenkontroll och de följer guidelines utarbetade av Spine Intervention Society, SIS. Detta för att säkerställa patientsäkerheten och att verksamheten är evidensbaserad och vetenskapligt förankrad.

Kliniken är kvalitets- och miljöcertifierad mot iso9001 och iso14001 via FR2000



<http://www.smartkliniken.eu>

Postadress:

Smärtkliniken Eques Indolor

Stolp-Ekeby 24

18695 Vallentuna

Telefon: 08-236500

Telefax: 090-186019

E-post: info@smartkliniken.eu

*Använd gärna **Mina Vårdkontakter***

Mottagningsadress Vallentuna

Stolp-Ekeby 24

18695 Vallentuna

GPS: (decimal) 59.6185, 18.1443

GPS: (WGS84)

N 59° 37.1092', E 18° 8.6574'

