

Användningsområde Godkänd för användning mot örtogräs i odling av vete, korn, höstråg, rågvete och dinkelvete.

All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåts.

**Behörighetsklass - 2L, endast för yrkesmässigt bruk
Reg.nr 4989**

Ett suspension koncentrat (SC) innehållande 500g/l diflufenikan.

Förvaras frostfritt

Satsnummer och tillverkningsdag: Se förpackningen.

Diflanil® 500 SC

UF: QN10-R0NN-R003-D1W9

Faro- och Skyddsangivelser

- H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P391 Samla upp spill.
P501 Innehållet och behållaren lämnas till en godkänd avfallsmottagare.
- SP1 Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare. (Rengör inte sprututrustningen i närheten av vattendrag/Undvik förorening via avrinning från gårdsplaner och vägar).
- EUH208 Innehåller 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on. Kan orsaka en allergisk reaktion.
- EUH401 För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.

VARNING



Ytterligare villkor för användning För att begränsa riskerna för växter utanför fältet ska ett vindanpassat skyddsavstånd bestämmas med hjälp av "Hjälpredan för bestämning av vindanpassat skyddsavstånd vid användning av lanbruksspruta med bom". Skyddsavståndet ska alltid bestämmas genom avläsning i kolumnen "särskild hänsyn" i Hjälpredan.

FÖRSTA HJÄLPEN Förtäring: Inducera ej kräkning. Skölj munnen med vatten.

Inandning: Frisk luft och vila. **Hudkontakt:** Tvätta med mycket varmt vatten och tvål, alternativt ta en dusch. Ta av förorenade kläder. **Kontakt med ögonen:** Tvätta omedelbart ögonen, skölj i 10 min. Om illamående/irritation kvarstår, sök omedelbart läkarvård (visa upp denna etikett om möjligt). I nödsituation, ring Giftinformationscentralen 112 (24 h).

BRUKSANVISNING

VIKTIGT: Alla anvisningar i detta avsnitt måste läsas noga för att få ett säkert och bra resultat av denna produkt.

Användning DIFLANIL 500 SC kan användas i höstsådd på hösten eller våren och i vårkorn och vårvete på våren. I höstsådd erhålles normalt bäst effekt och resultat om behandlingen sker på hösten. DIFLANIL 500 SC kan användas från strax efter sådd fram till slutet av bestockningen. Bäst effekt får man på ogräs som har mindre än 6 örtblad. DIFLANIL 500 SC passar utmärkt som blandningspartner till ogräsmiddel mot gräsogräs vid höstbehandling i höstsådd vilket ger många möjligheter till optimalt utnyttjande och effekt i förhållande till aktuell ogräsförekomst.

Verkningsätt DIFLANIL 500 SC tas upp av ogräsens blad och verkar som kontaktmedel. Vid utsprutning bildas en film på markytan, när sedan ogräsen växer igenom upptas preparatet av ogräsen. Ibland kan det förekomma vita fläckar på grödan vid en sen behandling men dessa är av övergående natur. Synliga effekter på ogräsen syns efter 2–5 dagar som ljusfärgning eller vitfärgning. Nytt ogräs gror normalt och ljusfärgas och dör senare.

DIFLANIL 500 SC bekämpar en rad olika örtogräs och viss effekt mot gräsogräs.

Effekt Ogräseffekt i % vid doserna 0,125–0,25 l/ha. Vid dos 0,25 l/ha Mycket god effekt till god effekt: Plister, åkerviol, veronika, förgätmigej, harkål, lomme, vätarv, åkerriättika, åkersenap. På små ogräs och gynnsamma förhållanden kan den lägre dosen ge en mycket till god effekt.

Markytan innan sprutning Bra ogräsbekämpning beror på väl nedbrukade växtrester eller halmrester före såbäddens beredning. Löst och fluffigt såbädd bör vättas innan sprutningen. Den slutliga såbädden ska vara utan jordkolor. Grödan bör stå till normal djup av 3 cm. Det är viktigt att se till att utsädet är väl täckt. Såbädden skall ha en god markfukt, långvarig torra minskar effekten. Vid mullhalt över 10 % saknas långtidseffekt.

Vattenmängd 200–400 l/ha. Det är viktigt med jämn sprutäckning av marken. Endast en behandling DIFLANIL 500 SC per gröda.

Dosering Höstvetet, höstkorn, råg, rågvete. Höstbehandling: Dos: 0,125–0,25 l/ha.

DIFLANIL 500 SC: Tidpunkt före eller efter grödans uppkomst till slutet av bestockningen.

Vårbehandling Dos: 0,125–0,25 l/ha DIFLANIL 500 SC från tillväxtens början till slutet av grödans bestockning. Observera att när ogräsen har mer än 4–6 örtblad ska den högre dosen användas.

Vårkorn och vårvete Dos: 0,125 l/ha DIFLANIL 500 SC. Tidpunkt när kornet/vårvetet är i mitten av bestockningen till slutet av bestockningen. Spruta alltid på små ogräs.

Begränsningar Vid eventuell omsådd på våren av en gröda som behandlats på hösten med DIFLANIL 500 SC, kan omsådd ske med vårkorn, vårvete efter en grundlig harvning, potatis kräver en plöjning. Vårlojeväxter, arter, bönor, lökväxter, klöver och betor skall undvikas för omsådd. Vid sådd av hösträps efter en behandlad gröda med DIFLANIL 500 SC på våren, rekommenderas en plöjning före sådd.

Tillredning Skaka dunken väl före användning. Fyll sprutan med rent vatten till hälften och tillsätt den mängd av DIFLANIL 500 SC som behövs, fyll sedan upp tanken.

Nettoinnehåll: 1L e
Satsnummer och tillverkningsdag: Se förpackningen.

Rengöring av sprututrustningen Det är viktigt att sprutan rengörs grundligt med sprutrenningsmedel efter behandlingen, eftersom små mängder preparat kan skada känsliga grödor.

Avfallshantering Rester, spill och ej rengjort tomlballage är farligt avfall och ska destrueras i enlighet med gällande lagstiftning. Rengjort tomlballage (efter minst 3 sköljningar med vatten) och ytteremballage som ej har varit i direkt kontakt med medlet kan lämnas på närmaste återvinningscentral för energiatvättning. Tom förpackning får inte återanvändas. **Rengjör förpackning kan lämnas till SvepRetur** (www.svepretur.se)

Lagring Torrt, svalt och frostfritt i väl tillsluten originalförpackning.

Utvidgat produktgodkännande av växtskyddsmedlet Diflanil 500 SC, reg nr 4989, till att omfatta följande mindre användningsområde: Mot ogräs i odlingar av gräs för utsäde.

Medgivandet gäller så länge Diflanil 500 SC är godkänt och under följande villkor:

- Dos: högst 0,15 l/ha Diflanil 500 SC
 - Högst 1 behandling får göras per kalenderår i samma gröda och på samma fält, genom behandling på hösten efter skörd av skyddsgröda eller på våren i etablerad gräsförvall.
 - För övrigt gäller samma villkor som i beslut om produktgodkännande för Diflanil 500 SC.
- Enligt artikel 51 förordning (EG) nr 1107/2009 om växtskyddsmedel: Den som använder växtskyddsmedel, som är godkänt i form av ett utvidgat användningsområde, gör det på eget ansvar och risk.

Odlarrisk Bruksanvisning och rekommendationer är baserade på omfattande försök och fleråriga erfarenheter. Nytt sortmaterial, förändrad odlingsteknik eller uppkommen resistens kan resultera i att preparatet inte ger önskad effekt eller till och med att skador uppstår på grödan. Tillverkaren ansvarar ej för uppkommen skada på grund av sådana förhållanden eller liknade omständigheter, vilka ej kunnat förutses vid preparatets saluförande.